

Haapa-ahonrämeen suokasvillisuusselvitys

Haapa-ahonräme kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokittelussa luokkaan 0, sillä suo on kauttaaltaan sarkoihin ojitettu ja suoluonto muuttunut suon keskellä Lusikkalammella esiintyvää ojikkolaikkua lukuun ottamatta. Ojikkolaikussa umpeenkasvaneen lammen päällä kasvaa luhtanevakorven ojikkoa (LuNKoj). Suon reunassa kivennäismaan tuntumassa tavattiin myös metsäkortekorven ojikko (MkKoj).

Suon kasvillisuus on valtaosin variksenmarjarahkarämeen, nevarämeen ja ruoho- ja heinäkorven muuttumaa. Suon länsiosissa on hakkuuaukkoja. Suon puusto on valtaosin kasvatusmännikköä, mutta männyn alispuustona kasvaa monin paikoin koivua. Suolla olevassa metsäsaarekkeessa, Pikkuniitynkankaalla, tavattiin kuusivaltaista mustikkatyyppin metsää, jossa kasvaa myös nuorta haapaa. Suon länsireunassa oleva karttaan merkitty lähde ei ole luonnontilaisen kaltainen vaan lähdeettä käytetään kaivona. Suon länsireunassa kasvaa paikoin järeäköä haapaa. Suota reunustavissa kivennäismaasaarekkeissa on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tervahautoja. Suon länsireunassa metsäsaarekkeessa on retkeilijöiden ja mahdollisesti metsästäjien käytössä oleva kota.

Suolla ei tavattu luonnontilaisia uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä eikä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä putkilokasvi- tai sammallajeja. Metsäkortekorven ojikossa kasvava pallopäärahkasammal (*Sphagnum wulfianum*) on Suomen kansainvälinen vastuulaji. Kasvillisuusselvityksen yhteydessä havaittu teeri (*Tetrao tetrix*) on silmälläpidettävä lintulaji.

Liitteet:

Liite 1. Haapa-ahonrämeen selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Haapa-ahonrämeeltä.

Liite 1. Haapa-ahonrämeen selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Haapa-ahonrämeeltä.



Kuva 1. Umpeenkasvaneen lusikkalammen päällä kasvaa luhtanevaporpi ojikko.



Kuva 2. Pitkälle edennyt nevarämeen muuttuma



Kuva 3. Ruoho- ja heinäkorpimuuttuma.