

## 1. Hevonvitunsuo, Kiiminki – Haukipudas

Hevonvitunsuo muistuttaa luontoarvopiirteiltään sen koillispuolella sijaitsevaa Kivisuota, mutta *Rhynchospora fusca* ruopparimpinevaa ja lettokasvillisuuteen yltäviä laikkuja ei tavattu, mutta sen sijaan tavattiin muutamia *Loeskyppnum badium* lettoneva- ja *Warnstorfia sarmentosa* lähdesuolaikkuja ja pienialainen koivuluhta kivennäismaan reunassa. Uhanalaisista kasvilajeista tavattiin *Dactolorhiza incarnata*, *Carex livida*, *Loeskyppnum badium* ja *Warnstorfia sarmentosa*. Pienen koivuluhdan yhteydessä esiintyi tervaleppä.

Itä-länsisuuntainen, hyvin saarekkeinen (osa kumpumoreeneita ilmeisesti) Hevonvitunsuo laskee vetensä koilliseen, pohjoiseen ja itään. Voimakkain lasku on itään kartassa Hevonvitunsuoksi merkityn suonosan kautta. Täällä on alueen lähes ainoa merkittävä rimpi-jännetopografian alue, jossa esiintyy mesotrofista *Carex livida* ruopparimpinevaa ja huomattava *Sphagnum pulchrum* rimpineva (SphRiN). Alueen itäpäässä on toinen hyvin rimpipintavoittainen, niukkajänteinen alue, näitä rimpitä luonnehtii monin paikoin *Trichophorum alpinum*. Soiden laitojen runsaat rahkavaltaiset kuviot ovat Hevonvitunsuolla pienempiä kuin Kivisuolla; parisen pientä rahkakeidasta tavataan kuitenkin täälläkin. *Loeskyppnum badium* lettonevalaikut ja *Warnstorfia sarmentosa* lähdesuolaikut sijaitsevat itäosassa kivennäismaan laidoissa Räippäselän NE-osissa ja Alajärvenkankaasta seuraavalla kankaalla siitä länteen. Pieni koivuluhta sijaitsee pienen saarekkeen itäreunalla aivan alueen keskellä, koivuvaltaisessa puustossa on harmaaleppää, reunamalla myös vähän tervaleppää.

Hevonvitunsuon saarekkeisessa keskiosassa ei ole ojia ja reunoillakin niitä on vain: koillis- ja itäosassa varsin vähän, luoteessa yksittäinen, lännessä enemmän. Aivan lievää kasvillisuuden muuttumista kuivahtamisen vuoksi havaittiin koillisosassa (ennallistamismahdollisuus). LT 4 (31/2).