

## Honkasuo, Utajärvi, Kes kiboreaaliset aapasuot (KBA), väli-rimpipintainen, EN

Honkasuo on luonnontilaisuusasteeltaan luokan 2 suo. Sen reuna-alueet ovat ojitettuja, kun taas inventointialueen keskellä on suuri, keskiosistaan ojittamaton suonosa. Kyseisen suonosan ympärillä on myös muutamia pienempialaisia keskiosistaan ojittamattomia laikkuja, joita erottaa keskusta-alueen suosta vain yksi oja. Inventointialue on käytännössä jo kokonaan kuivunut eriasteisiksi kuivakoiksi, muuttumiksi, ja jopa turvekankaiksi. Keskusta-alueen suota halkoo itäosassa Korteoja, jonka itäpuolisella suonosalla esiintyy luhtanevakuivakkoa. Länsirannan tuntumassa on puolestaan oligotrofista lyhytkorsiräme-, ja mesotrofista rahkaista suursaranevakuivakkoa. Pohjoisempana kyseinen oja yhtyy inventointialueen pohjoisreunan vieritse virtaavaan Koivujokeen. Koivujoki on luonnonoja, joka ei ole kuitenkaan enää täysin luonnontilainen siihen johdettujen kaivettujen ojien vuoksi. Tämän luonnonojan varrella ja lähialueilla esiintyy oligotrofista lyhytkorsiräme-, ja -nevakuivakkoa, oligotrofista suursaranevakuivakkoa, sekä luhtanevakuivakkoa. Lisäksi Kotasaaren itäkärjen lähistöllä esiintyy jo miltei turvekankaaksi muuttunutta, mutta kuitenkin yhä kuivakoksi luettavaa mesotrofista sarakorpea. Loppuosa inventointialueen suurimmasta ojittamattomasta suonosasta muodostuu pääasiassa runsaasti keloja ja männyn taimia omaavasta oligotrofisesta lyhytkorsirämeestä, joka on muuttunut lieväksi kuivakoksi. Tämän suoalueen kaakkoispuolella sijaitsevalla pienempialaisella keskiosistaan ojittamattomalla suolaikulla esiintyy oligotrofista *Sphagnum*-rimpineva-, ja rahkaista kalvakkanevakuivakkoa, joiden kattama alue on kuivumisen seurauksena puustoutunut.