

Kesonnevan suokasvillisuusselvitys

Kesonneva kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa soiden luonnontilaluokittelussa luokkaan 1, sillä valtaosa suosta on ojitettu ja suon kasvillisuus on pitkälle muuttunut, mutta suon pohjoisosassa on luonnontilaisen kaltainen ojikkolaikku. Laikussa kasvaa oligotrofista rimpinevaräme ojikkoa (OIRiNRoj). Suon eteläosan ojittamattomassa laikussa kasvaa mesotrofisen rimpinevarämeen muuttumaa (MeRiNRmu), jonka rimpipinnat ovat kokonaan kuivuneet mutta kasvillisuusmuutokset eivät ole edenneet pitkälle. Myös suon sarkoihin ojitetussa osassa kasvaa rimpinevarämeen muuttumaa, jossa rämevarpujen peittävyys ja rahkaisuus ovat lisääntyneet ja rimmet ovat monin paikoin jäkäläpeitteiset. Suon puusto on pääosin kasvatusmännikköä, jonka alispuustona kasvaa paikoin männyn ja koivun taimia. Suon reunoilla on korpirämeen ja korpien muuttumia.

Suolla tavattu metso (*Tetrao urogallus*) on silmälläpidettävä lintulaji. Suolla ei havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä putkilokasvi- tai sammallajeja tai luonnontilaisia suotyyppejä. Suon luontoarvot ovat kokonaisuutena varsin vähäiset.

Liitteet:

Liite 1. Kesonnevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Kesonnevan suotyypeistä

Liite 1. Kesonnevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Kesonnevan suotyypeistä



Kuva 1. Rimpinevaräme ojikko suon pohjoisosassa.



Kuva 2. Mesotrofisen rimpinevarämeen muuttuma suon eteläosassa.



Kuva 3. Pitkälle edennyttä rimpinevarämeen muuttumaa, jossa rimpipinnat jäkäläpeitteiset.