

## 1. Kivisuo – Haapasuo, Haukipudas

Kivisuon – Haapasuon alue erottuu muista Kiimingin – Haukiputaan muista kohteista *Rhynchospora fusca* -rimpinevaesiintymänsä puolesta (Haapasuon esiintymä; muualla Kiimingin – Haukiputaan kohteista sitä on vain Satamosuolla niukkana). Lettoisuutta esiintyy rimpipinnalla pienenä alana (*Revolvans* rimpiletto), samoin karun pään lettonevarämettä (SphLNR). Korvista tavattiin yhtä tyyppiä (RhKgK). Uhanalaisten kasvilajien määrä on varsin suuri, keskitasoa Kiimingin – Haukiputaan suoryhmässä (*Dactolorhiza incarnata*, *Carex livida*, *Juncus stygius*, *Hammarbya paludosa*, *Rhynchospora fusca*, *Selaginella selaginoides*, *Loeskyprnum badium*).

Kivisuo (ilman Haapasuota) on eräänlainen pääosin niukkajänteisen, tasaisen rimpipinnan vallitsema keidasaapasuo, jossa keidasosat ovat rahkakeitaita (pohjoisosan osin viettokeitaalta näyttävällä alueella ei käyty). Aapasuon syrjäosat ovat alaltaan vähäisiä (paitsi itäosa ja ison pohjavesi-sorakuopan pohjoispuoliset alat) ja juotteja on niukasti. Kivisuon ja Haapasuon välimailla virtaa suon alueella pitkä luonnonpuro (Haapaoja). *Rhynchospora fusca* -neva sijaitsee Haapasuolla ison pohjavesialtaan/ sorakuopan kohdalla, sen pohjoispuolella. Laji ei kärsi aivan vähäisistä mahdollisista pohjavesihäiriöistä, mahdollisesti osittain jopa päinvastoin. Letto- ja korpilaikut ovat laajan suokompleksin suppeassa distaalikohdassa, vedenpurkausalueella (lähellä kohtaa, jossa Haapaoja laskee pois suolta).

Kivisuon – Haapasuon kokonaisuudessa on oja suon reunoilla ja suolla hyvin vähän: (1) koillisessa pätkä, (2) tieltä vesiä purkava oja idässä ja (3) Haapasuon distaaliosan tienoilla (vähän enemmän). Luonnontilaluokka 4.