

## Kopakkanevan suokasvillisuusselvitys

Kopakkanevan kasvillisuus selvitettiin 27.8.2011. Kopakkaneva kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokituksessa luokkaan 1, sillä suo on lähes kauttaaltaan sarkoihin ojitettu, ja ainoastaan suon pohjoisosassa on ojittamattomia laikkuja. Sarkoihin ojitetuissa osissa kasvillisuus on pitkälle muuttunutta, ja ojittamattomissa laikuissa kasvaa kasvillisuudeltaan vähemmän muuttunutta *Sphagnum*-rimpinevan ja nevarämeen muuttumaa (SphRiNmu, NRmu). Suon ojittamattomat osat ovat voimakkaasti taimettuneet ja vaivaiskoivu on runsastunut sekä ojitetuissa että ojittamattomissa osissa. Sarkoihin ojitetuissa osissa nevarämeen muuttuma on pitkälle muuttunutta. Kasvillisuusmuutokset ovat paikoin edenneet turvekangasasteelle ja suolla kasvaa mm. puolukkaturvekangasta. Suon puusto on noin 15 metrin korkuista kasvatusmännikköä, jonka seassa kasvaa monin paikoin koivua. Suolta ei havaittu luonnontilaisia suotyyppejä eikä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä putkilokasvi- tai sammallajeja.

Liitteet:

Liite 1. Kopakkanevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Kopakkanevan suotyypeistä

Liite 1. Kopakkanevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Kopakkanevan suotyypeistä



Kuva 1. Nevarämeen muuttuma suon ojittamattomassa laikussa.