

Kuoppanevan suokasvillisuusselvitys

Kuoppaneva kuuluu kansallisessa suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokittelussa luokkaan 1, sillä valtaosa suosta on ojitettu ja ojittamaton osa on hyväkuntoisten ojien ympäröimä. Suon ojittamattomassa osassa kasvillisuus on luonnontilassa, mutta lievää kuivahtamista ja puuston kasvun elpymistä on havaittavissa.

Suon ojittamattomassa osassa kasvaa mesotrofista rimpinevarämettä (MeRiNR) jonka ruopparimmissä kasvaa yleisenä alueellisesti uhanalainen rimpivihvilä sekä Suomen kansainvälinen vastuulaji kurjenrahkasammal. Rimmet ovat yhä vetisiä ja melko hyväkuntoisia, vaikka välipinnat ovatkin voimistuneet etenkin lähellä ojia. Rimpinevaräme on Suomen luontotyyppien uhanalaisarvion (Raunio ym. 2008) mukaan Etelä-Suomessa silmälläpidettävä suotyyppi.

Ojittamattoman osan eteläpäässä on tuore uudisoja, ja suota on monin paikoin kunnostusojitettu. Suon ojitetussa osassa kasvaa rimpinevarämeen muuttumaa, jossa esiintyy paikoin keskiravinteisuutta. Paikoin kasvillisuus on pitkälle muuttunutta nevarämeen muuttumaa, jonka alkuperäistä suotyyppiä on mahdoton tunnistaa.

Paikallistiedon mukaan suota käytetään marjastukseen; muita erityisiä virkistysarvoja suolla ei ole. Suolla elävä teeri (*Tetrao tetrix*) on silmälläpidettävä lintulaji.

Liitteet:

Liite 1. Kuoppanevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Kuoppanevan suotyypeistä

Liite 2. Kuvia Kuoppanevan suotyypeistä.



Kuva 1. Mesotrofinen rimpinevaräme suon ojittamattomassa osassa.