

Kylmäsuo, Muhos, Keskiboreaaliset aapasuot (KBA), väli-rimpipintainen, EN

Kylmäsuon luonnontilaisuusaste on luokkaa 1. Inventointialue on miltei kokonaan ojitettu. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan pari alueen länsiosan pienehköä, keskiosistaan ojitamatonta laikkuu. Pohjoisempi laikuista käsittää luonnontilaisen kaltaista oligotrofista lyhytkorsinevaa ja lisäksi pienialaisesti kalvakkanevaa. Laikulla on jo hieman nähtävissä kuivumisen vaikutuksia, mutta suotyypit eivät toistaiseksi ole vielä kuivakkoasteella. Etelämpänä sijaitsevan suuremman laikun suotyypit ovat joko luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Laikku koostuu pohjoispäädyn oligotrofisesta kalvakkanevasta ja pienialaisesta kanervarahkarämeestä, sekä keski-, ja eteläosan rimpinevoista. Rimpialueella esiintyy sekä oligotrofista *Sphagnum*-rimpinevaa että mesotrofiaan yltävää ruoppa-, ja *Sphagnum*-rimpinevaa. Lisäksi alueella esiintyy melko suuriakin avovesirimpiä. Kyseisellä ojitamattomalla laikulla on hienon näköistä mosaiikkimaista suomaisemaa. Laikun eteläpäädyistä alkavan ojitusalueen alussa esiintyy lisäksi ojikkoasteella olevaa oligotrofista kalvakkanevaa ja rimpinevarämettä. Inventointialueen muut osat koko itäinen osa mukaan lukien koostuvat lähes pelkästään pitkälle edenneistä puustoisista muuttumista ja turvekankaista. Itäosan puolukkaturvekankaalla on tehty jo harvennushakkuutakin, ja osalla tyyppiä myös kunnostusojitusta. Inventointialueen länsiosan koillispäädyssä on kuitenkin yhä miltei puuton oligotrofinen kalvakkanevamuuttuma, jolla on pääosin vasta hyvin harvassa kasvavia männyn taimia.