

## **Lahnasneva, Siikalatva, Keskiporaaliset aapasuot (KBA), väli-rimpipintainen, EN**

Lahnasneva on luonnontilaisuusasteeltaan luokan 1 suoalue. Se koostuu ojitusalueista sekä ojitusten pirstomista erikokoisista keskiosistaan ojittamattomista laikuista. Alueella on myös kaksi laaja-alaista turvetuotantoaluetta. Alueella olevien ojittamattomien laikkujen keskusta-alueilla esiintyvät suotyypit ovat kuitenkin säilyneet monin paikoin luonnontilaisen kaltaisina. Inventointialueella esiintyviä luonnontilaisen kaltaisia suotyyppejä ovat mm. *Sphagnum*-kuljuneva, variksenmarjarahkaräme, oligotrofinen *Sphagnum*-rimpineva ja jopa jänne-rimpi -rakennelmaa omaava oligotrofinen *Sphagnum*-rimpinevaräme. Laikkujen keskusta-alueiden suotyypeistä Lahnasmäki -kangasmetsäalueen eteläpuolella sijaitsevalla oligotrofisella *Sphagnum*-rimpinevalla ja saman kankaan koillispuolisella *Sphagnum*-kuljunevalla on jo nähtävissä kuivumista suovedenpinnan laskun takia. Toistaiseksi ainoastaan jälkimmäinen suotyypeistä on muuttunut kuivakoksi, joka on tosin vasta lievää. Peruskartan mukaan inventointialueella on Lahnasjärvi -niminen alue, jonka keskiosissa esiintyy pieniä lampia. Näitä lampia ei maastotarkastelussa ollut kuitenkaan mahdollista nähdä niitä ympäröivän laajan saraikkoalueen seasta. Alueen suotyypinä on oligotrofinen varsinainen suursaraneva. Alueen nimestä päätellen kyseiset lammet saattavat kuitenkin olla jäänteitä alueella aikaisemmin olleesta ja sittemmin kuivatusta järvestä/lammesta. Tähän viittaa myös se, että alueella sijaitsee kyseiseltä suursaranevalta alkunsa saava leveä ja runsasvetinen kaivettu Lahnaskanava -oja. Suoalueella on monia kangassaarekkeita, joista harjumainen Lahnasmäki -kangassaareke on louhikkoinen. Ojitetuilla osilla esiintyy eriasteisesti taimettuneita tai suuripuustoisia muuttumia, sekä turvekankaita.