

Levänevan suokasvillisuus selvitys

Leväneva kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa soiden luonnontilaluokittelussa luokkaan 1, sillä suolla on ojittamattomia ja ojitetuja osia ja suoveden pinta on kauttaaltaan alentunut myös suon ojittamattomassa osassa rimpipinnoista välipintamaisiksi. Ojittamattoman osan läpi kaivetut ojat kuljettavat edelleen vettä kuivattaen suota. Suo lienee kokonaisuutena aapasuo, sillä suolla kasvaa enimmäkseen minerotrofisia suotyyppejä. Ojittamattoman osan nevat ovat rahkoittuneet kuivumisen seurauksena.

Leväneva edustaa suoyhdistymätyyppiä keskiboreaalinen aapasuo, joka on Suomen luontotyyppien uhanalaisarvion (Raunio ym. 2008) mukaan sekä valtakunnallisesti että alueellisesti uhanalainen suoyhdistymätyyppi. Suon ojittamattomassa osassa kasvaa oligotrofista *Sphagnum*-rimpinevaa (OISphRiN) ja oligotrofista lyhytkorsinevaa (OILkN). Karuimmissa kohdissa kasvaa puutonta rahkarämettä eli rahkanevaa (RaN) sekä variksenmarjarahkarämettä (VaRaR). Suon pohjoisosassa kasvaa oligotrofista rimpinevarämettä (OIRiNR) ja eteläosassa laikku oligotrofista lyhytkorsirämettä (OILkR).

Suon ojitetussa osassa kasvaa rimpinevarämeen ja muuttumaa ja pitkälle edennyttä nevarämeen muuttumaa. Ojitetun osan puusto on noin 15 metrin korkuista kasvatusmännikköä. Suolla tavattu keltävästäräkki (*Motacilla flava*) on valtakunnallisesti uhanalainen lintulaji. Suon ojittamattomassa osassa elävä kapustarinta (*Pluvialis apricaria*) on lintudirektiivin (79/409/ETY) I-liitteen laji. Suolla ei havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä putkilokasvi- tai sammallajeja.

Liitteet:

Liite 1. Levänevan selvitysalueen kartta

Liite 1. Levänevan selvitysalueen kartta