

## Lippinevan suokasvillisuus selvitys

Lippinevan, Laitanevan ja Heikinlahjan muodostamasta suokokonaisuudesta käytetään tässä kuvauksessa nimeä Lippineva. Suon kasvillisuus selvitettiin maastokäynnillä 8.7.2011. Kasvillisuus selvitysten yhteydessä tehdyt lintuhavainnot kirjattiin ylös. Suo kuuluu kansallisessa suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokittelussa luokkaan 1, sillä suo on kauttaaltaan sarkoihin ojitettu lukuun ottamatta suhteellisen pienialaista ojittamatonta aluetta suon pohjoisosassa. Ojittamattomalla alueella kasvaa mesotrofista rimpinevarämettä (MeRiNR), jonka rimpipinnat ovat yhä melko hyväkuntoiset mutta jossa esiintyy lievää taimettumista. Rimpinevaräme on Suomen luontotyyppien uhanalaisarvion (Raunio ym. 2008) mukaan Etelä-Suomessa silmälläpidettävä suotyyppi. Osassa ojittamatonta aluetta suoluonto on ojikkoasteella: rimpipinnat ovat surkastuneet ja alueet ovat taimettuneet. Ojittamattoman alueen itäosassa on tuore uudisoja.

Suon ojitetussa osassa kasvaa valtaosin mesotrofisen rimpinevarämeen, ruoho- ja heinäkorven sekä tunnistamattoman mesotrofisen nevarämeen muuttumaa. ojitetussa osassa havaittiin myös pallosararäme ojikko ja mesotrofisen lyhytkorsirämeen ojikko. Suon puusto on uudistettu männylle. Ruohoisten paikkojen puusto on koivun, kuusen, männyn ja harmaalepän sekapuustoa. Suolta ei havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasvi- tai lintulajeja.

Liitteet:

Liite 1. Lippinevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Lippinevan suotyypeistä

Liite 1. Lippinevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Lippinevan suotyypeistä.



Kuva 1. Mesotrofinen rimpinevaräme suon ojittamattomassa osassa.