

Pyöriäsuon suokasvillisuus selvitys

Pyöriäsuo kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokituksessa luokkaan 1, sillä suo on lähes kauttaaltaan sarkoihin ojitettu ja suoluonto valtaosin pitkälle muuttunutta. Osa suosta on lisäksi raivattu pelloiksi. Suolla on kuitenkin ojittamaton alue, jossa kasvillisuus on säilynyt luonnontilassa lukuun ottamatta puuston kasvun elpymistä ja lievää nevapintojen jäkälöitymistä. Ojittamattomassa laikussa kasvaa keidasrämettä. Suon kasvillisuus on valtaosin niin pitkälle edennyttä muuttumaa, että sen alkuperäistä suotyyppeä on mahdoton tunnistaa. Suolla on pohjois-eteläsuuntainen rantavalli, jonka molemmin puolin kasvaa varputurvekangasta (VaTKg). Suolla tavattiin myös tupasvillarämeen ojikkoja (TRoj).

Suolla ei havaittu luonnontilaisia uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppisiä eikä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä putkilokasvi- tai sammallajeja. Kasvillisuus selvityksen yhteydessä havaitut teeri (*Tetrao tetrix*) ja niittykirvinen (*Anthus pratensis*) ovat silmälläpidettäviä lintulajeja. Suolla on riistatorni, joka kertoo suon metsästyskäytöstä.

Liitteet:

Liite 1. Pyöriäsuon selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Pyöriäsuolta.

Liite 1. Pyöriäsuon selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Pyöriäsuolta.



Kuva 1. Keidasrämettä suon ojittamattomassa osassa.



Kuva 2. Kasvillisuusmuutokset ovat edenneet suolla paikoin turvekangasasteelle.