

Raasakkasuon suokasvillisuusselvitys

Raasakkasuon kasvillisuus selvitettiin 8.9.2011. Raasakkasuo kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokituksessa luokkaan 1, sillä valtaosa suosta on sarkoihin ojitettu, mutta suota lännessä rajaavan Pohjois-Kouluanjoen ranta on ojittamatta, ja rannalla kasvaa sara- ja ruoholuhtaa (SRhLu) ja luhtanevakorpea (LuNK). Joki on suon pohjoisosassa luonnontilassa. Suon ojitetuissa osissa kasvaa nevarämeen ja nevakorven muuttumaa (NRmu, NKmu). Suon puusto on 10–15 metrin korkuista kasvatusmännikköä, jonka seassa kasvaa paikoin koivua. Suon koillisosassa on taimikko, jonka kasvillisuus on luhtanevakorven muuttumaa. Selvitysalueen luoteisosassa havaittiin aitokorven muuttumaa (Kmu), jossa kasvaa Suomen kansainvälinen vastuulaji pallopäärahkasammal (*Sphagnum wulfianum*). Suolla ei havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä putkilokasvi- tai sammallajeja. Kasvillisuusselvityksen yhteydessä havaittu teeri (*Tetrao tetrix*) on silmälläpidettävä lintulaji.

Liitteet:

Liite 1. Raasakkasuon selvitysalueen kartta.

Liite 2. Kuvia Raasakkasuolta.

Liite 1. Raasakkasuon selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Raasakkasuolta.



Kuva 1. Pohjois-Kouluanjoki ja sen rantojen luhtaa.



Kuva 2. Joen rannalla kasvavaa luhtanevaporpea.



Kuva 3. Nevakorven muuttuma on suon yleisin suotyyppi.