

Siltanevan suokasvillisuus selvitys

Siltaneva kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokittelussa luokkaan 1, sillä suon ojittamattomassa osassa esiintyy selvää suoveden pinnan laskemista, taimettumista ja puustoittumista. Suon koillisosassa on pelto ja sen länsipuolella turpeenottokenttä.

Suo on keskiravinteinen aapasuo, jonka yleisin suotyyppi on mesotrofinen rimpinevaräme (MeRiNR). Rimpinevaräme on Suomen luontotyyppien uhanalaisarvion (Raunio ym. 2008) mukaan Etelä-Suomessa uhanalainen suotyyppi. Rimpinevarämeellä kasvava rimpivihvilä on alueellisesti uhanalainen kasvilaji. Suon eteläpään kapeimmassa kohdassa kasvaa luhtanevakorpi ojikkoo muistuttavaa koivuvaltaista kasvillisuutta, jossa koivu on runsastunut voimakkaasti. Koivuvaltaisen suoluonnon eteläpuolella kasvaa mesotrofista saraneva ojikkoo. Suon keskiosassa tavataan mesotrofista sararäme ojikkoo. Suon pohjoisosassa sarkoihin ojitetulla alueella kasvaa mesotrofista nevakorpi muuttumaa, joka on osassa selvitysaluetta päätehakattu. Suon länsireunassa Puronlehdon tuntumassa kasvaa pieninä laikkuina korpirämettä (KR) ja metsäkortekorpea (MkK), jotka ovat sekä Etelä-suomessa että valtakunnallisesti uhanalaisia suotyyppisiä. Suolla elävä niittykirvinen (*Anthus pratensis*) on silmälläpidettävä lintulaji.

Liitteet:

Liite 1. Siltanevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Siltanevan suotyypeistä

Liite 1. Siltanevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Siltanevan suotyypeistä.



Kuva 1. Mesotrofinen rimpinevaräme suon keskiosassa.



Kuva 2. Metsäkortekorpilaikku Purolehdon reunalla.



Kuva 3. Luhtanevakorpi ojikkoja muistuttavaa kasvillisuutta suon eteläosassa.