

Tähysnevan suokasvillisuusselvitys

Tähysnevan kasvillisuus selvitettiin 23.7.2011. Kasvillisuus selvityksen yhteydessä tehdyt lintuhavainnot kirjattiin ylös. Tähysneva kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokituksessa luokkaan 0, sillä suo on kauttaaltaan ojitettu ja suon kasvillisuus on rahkarämeen ja rimpinevarämeen muuttumaa, joka on monin paikoin pitkälle muuttunutta. Suon keskusta on ombrotrofinen ja rahkainen, mikä osoittaa suon olevan keidassuo. Variksenmarjarahkarämeen muuttumalla (VaRaRmu) varpisuus on lisääntynyt. Rimpinevaräme muuttuma (RiNRmu) muistuttaa isovarapurämettä, mutta niukasti esiintyvät nevapintalajit ja silmäkerahkasammal osoittavat alkuperäisen suotyypin rimpinevarämeeksi. Tähysnevalta tavatut teeri (*Tetrao tetrix*) ja metso (*Tetrao urogallus*) ovat silmälläpidettäviä lintulajeja. Tähysnevalta ei havaittu luonnontilaisia suotyyppisiä eikä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä putkilokasvi- tai sammallajeja.

Liitteet:

Liite 1. Tähysnevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Tähysnevan suotyypeistä

Liite 1. Tähysnevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Tähysnevan suotyypeistä



Kuva 1. Rimpinevarämeen muuttuma on pitkälle muuttunut ja muistuttaa isovarpurämettä.