

## Tattarineva, Pyhäntä

Iso Lamujärven koillispuolinen Tattarineva on laaja keidassuo, jossa kermien ja kuljujen mosaikki on epäsäännöllinen. Kuljupinnat ovat vahvasti rahkavaltaisia. Muutamien saraisten rimprien kohdalla sijaitti kahlaajakeskittymiä. Myös lyhytkorsirimpiä esiintyi. Avosuon reunoilla oli yleisesti tupasvilla-sararämettä, mikä vaikutti olevan kanalinnuille mieluisinta ympäristöä. Reunojen rämeet olivat etenkin länsiosassa laajalti kuolleita eli muuttumassa nevoiksi. Ympäröivät alueet ja suon entiset osat oli kuitenkin vahvasti ojitettu. Osa ojista on kunnostettu noin 10 vuotta sitten.

Taulukko 7. Pyhäntään Tattarinevan kartoitustulokset

Pinta-ala, ha		500
Laskenta-aika		27.5.2011, klo 2:45–8:00
Laskentareitti, km		
Laskijoita, hlö		3
Laskentateho		Hyvä
Laji	Species	
Laulujoutsen	<i>Cygnus cygnus</i>	1
Tavi	<i>Anas crecca</i>	2
Pyy	<i>Bonasa bonasia</i>	1
Riekko	<i>Lagopus lagopus</i>	7
Teeri	<i>Tetrao tetrix</i>	19
Tuulihaukka	<i>Falco tinnunculus</i>	1
Kurki	<i>Grus grus</i>	3
Kapustarinta	<i>Pluvialis apricaria</i>	6
Jänkäkurppa	<i>Lymnocyptes minimus</i>	1
Taivaanvuohi	<i>Gallinago gallinago</i>	8
Pikkukuovi	<i>Numenius phaeopus</i>	22
Kuovi	<i>Numenius arquata</i>	9
Valkoviklo	<i>Tringa nebularia</i>	2
Liro	<i>Tringa glareola</i>	11
Kalalokki	<i>Larus canus</i>	5
Harmaalokki	<i>Larus argentatus</i>	3
Suopöllö	<i>Asio flammeus</i>	1
Niittykirvinen	<i>Anthus pratensis</i>	41
Keltavästäräkki	<i>Motacilla flava</i>	21
Pensastasku	<i>Saxicola rubetra</i>	15
Pohjansirkku	<i>Emberiza rustica</i>	1
Suolintujen lajimäärä		21
Yhteensä, paria		180
Tiheys, paria/ km <sup>2</sup>		36,0
Vesilinnut, paria		3
Lajimäärä		2
Tiheys, paria/km <sup>2</sup>		0,6
Kahlaajat, paria		59
Lajimäärä		7
Tiheys, paria/km <sup>2</sup>		11,8

Suolla oli paljon kanalintuja ja kahlaajia. Merkittävimpiä löytöjä oli jänkäkurban reviiri. Suolla on erityisen tiheä pikkukuovikanta: 22 reviiriä (yli 4 rev/km<sup>2</sup>)! Puoliaukeilla paikoilla esiintyi hyvin pensastaskuja (15 rev) ja keltävästäräkkejä (21 rev). Runsain suolaji oli niittykirvinen (41 reviiriä). Petolinnuista alueella tavattiin varoiteleva tuulihaukka ja hätäilevä suopöllö. Reunarämeellä tavattiin yksi pohjansirkun reviiri, potentiaalista ympäristöä oli useammallekin reviirille.

Tiira-tietokannassa ja PPLY:n arkistossa on havaintoja Tattarinevalta. Suokukkonaaras varoitteli suolla 5.7.2008 melko varmasti maastopoikueen läheisyydessä. Kesän 2011 kartoituksen lisäksi tuulihaukasta on havainto kahdesta yksilöstä 6.7.2008. Samalta päivältä on merkintä myös paikallisesta nuolihaukasta. Suolla havaittiin kaksi pikkutylliä 30.6.2001.

Suon laiteiden ojitusten vuoksi Tattarinevan luonnontilaisuusluokaksi määriteltiin 2. Luokitus ei ole kiistaton, sillä suolla on myös ojittamattomia reunoja. Tattarineva on keskeisiltä osiltaan luonnontilainen ja vähintään maakunnallisesti arvokas lintusuo.