

Tuohinevan suokasvillisuusselvitys

Tuohinevan kasvillisuus selvitettiin 29.8.2011. Tuohineva kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokituksessa luokkaan 1, koska suo on lähes kauttaaltaan sarkoihin ojitettu ja kasvillisuus muuttunut mutta Tuohilampea ympäröivällä nevalle kasvillisuus on luonnontilassa.

Tuohilammen ojittamattomassa rantavyöhykkeessä kasvaa luhtanevaa (LuN) sekä luhtaista oligotrofista saranevaa (LuOISN) ja sarakorpea (LuOISK). Lampi on osittain umpeenkasvanut mutta yhä luonnontilaisen kaltainen. Lampi ei kokonsa puolesta ole metsälakikohde.

Suon ojitetussa osassa kasvaa pitkälle edennyttä nevarämeen muuttumaa (NRmu) ja rahkarämeen muuttumaa (RaRmu) sekä puolukka- ja varputurvekangasta (PTKg, VaTKg). Suon puusto noin 15–20 metrin korkuista kasvatusmännikköä. Puolukkaturvekankaalla kasvaa männyn ja koivun sekapuustoa.

Suolla esiintyvät saraneva ja sarakorpi ovat Suomen luontotyyppien uhanalaisarvion (Raunio ym. 2008) mukaan Etelä-Suomessa uhanalaisia suotyypejä ja luhtaneva Etelä-Suomessa silmälläpidettävä luontotyyppi. Suolta ei havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä putkilokasvi- tai sammallajeja. Kasvillisuusselvitysten yhteydessä havaittu metso (*Tetrao urogallus*) on silmälläpidettävä lintulaji. Suon läpi kulkevan tien reunoilla on riistatorneja, mikä kertoo suon metsästyskäytöstä.

Liitteet:

Liite 1. Tuohinevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Tuohinevan suotyypeistä

Liite 1. Tuohinevan selvitysalueen kartta.

Liite 2. Kuvia Tuohinevan suotyypeistä.



Kuva 1. Luhtanevaa Tuohilammen lähellä.



Kuva 2. Luhtainen oligotrofinen sarakorpi lammen rannan tuntumassa.



Kuva 3. Tuohilampi ja sen rannan luhtaista oligotrofista saranevaa.



Kuva 4. Rahkarämeen muuttumaa suon ojitetussa osassa.