

Ukonpolttamansuo, Ii, Keskiporaaliset aapasuot (KBA), väli-rimpipintainen, EN

Ukonpolttamansuo on luonnontilaisuusasteeltaan luokkaa 2. Suon keskiosistaan ojittamattoman alueen eteläreunassa on laaja ojitusalue, kun taas pohjoisreuna rajautuu kahteen kangasalueeseen. Näistä pidemmän reuna-alueella on muutamia ojia, mutta kangasalueista lyhyempi on sen lounaispäädyn vierellä sijaitsevaa ojitusaluetta lukuun ottamatta ojittamaton. Inventointialueen ojittamattoman osan keskialueilla esiintyy luonnontilaisen kaltaista mesotrofista *Sphagnum*-rimpinevaa. Suoalueen reunaosien suotyypit ovat jo muuttuneet kuivakoiksi, ja suurella osalla kuivakkoaluetta kasvaa harvakkosti männyn ja hieskoivun taimia. Poikkeuksena osassa kangasalueeseen rajautuvaa ojittamatonta suonreunaa esiintyy kuitenkin yhä luonnontilaisen kaltaisina varsinaista isovarpu- pallosara-, ja kanervarahkarämettä. Ojitusalueella esiintyy puolukka- ja varputurvekangasta.