

Vasamannevan suokasvillisuus selvitys

Vasamannevan kasvillisuus selvitetiin 9.7.2011. Maastokäynti kohdistui lähinnä suon ojittamattomiin osiin. Vasamanneva kuuluu kansallisen suo- ja turvestrategian mukaisessa luonnontilaisuusluokittelussa luokkaan 1, sillä valtaosa suosta on ojitettu sarkoihin, osassa suota on turpeennostokenttä ja suon ojittamaton osa on suhteellisen pienialainen. Ojittamattomassa osassa kasvaa mesotrofisen rimpinevarämeen ojikkoa, jonka lajisto on säilynyt luonnontilaisena, mutta rimpipinnat ovat kuivuneet. Alueella kasvaa kymmeniä yksilöitä valtakunnallisesti uhanalaista suopunakämmekkää (*Dactylorhiza incarnata* ssp. *incarnata*) sekä siellä täällä alueellisesti uhanalaista rimpivihvilää (*Juncus stygius*). Suolla olevat hyväkuntoiset ojat estävät vesien valumisen mineraalimailta luonnontilaisen kaltaiseen osaan, joten suon luontaisen kasvillisuuden säilymiselle ei ole edellytyksiä. Lisäksi suota kuivatetaan pumppaamalla vettä ojasta pintavalutuskentälle.

Suon ojitetussa osassa kasvaa mesotrofisen rimpinevarämeen muuttumaa (MeRiNRmu), jossa rimmet ovat kuivuneet. Muuttuma on rahkoittunut ja taimettunut ja muistuttaa paikoin rahkarämettä, mutta keskiravinteisuuden ilmentäjiä esiintyy monin paikoin.

Suolla tavattu teeri (*Tetrao tetrix*) on silmälläpidettävä lintulaji ja kapustarinta (*Pluvialis apricaria*) on lintudirektiivin (Euroopan Komissio 2009/147) I-liitteen laji.

Liitteet:

Liite 1. Vasamannevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Vasamannevan suotyypeistä

Liite 1. Vasamannevan selvitysalueen kartta

Liite 2. Kuvia Vasamannevan suotyypeistä.



Kuva 1. Mesotrofisen rimpinevarämeen ojikkoja suon ojittamattomassa osassa.



Kuva 2. Turpeennostoalueelta tulevaa vettä pumpataan pintavalutuskentälle.