

Ylisuo, Utajärvi, Keskiboreaaliset aapasuot (KBA), väli-rimpipintainen, EN

Ylisuon luonnontilaisuusaste on luokkaa 1. Ylisuon luoteis-, ja pohjoisosat on kattavasti ojitettu lukuun ottamatta yhtä pienehköä keskiosistaan ojitamatonta laikkua. Inventointialueen keskellä on sekä keskiosistaan että osaksi myös kangasalueisiin rajoittuvista reunaosistaan ojitamaton suonosa, jonka kaakkoispuolella vain muutaman ojan erottamana on toinen, ojitustilanteeltaan samankaltainen pienempi suolaikku. Inventointialueen keskellä olevalla keskiosistaan ojitamattomalla suoalueella esiintyy selkeiden kuivakkojen lisäksi myös toistaiseksi luonnontilaisen kaltaisina säilyneitä suotyyppejä. Näihin tyyppeihin lukeutuvat alueella mm. oligotrofinen kalvakkaneva, *Sphagnum*-kuljuneva, pallosararäme, sekä mesotrofiaan yltävät ruopparimpineva ja kalvakka suursaraneva. Monilla näistä tyypeistä on kuitenkin jo nähtävissä jonkinasteista kuivumista (esimerkiksi suovedenpinnan laskuna) ilman merkittäviä kasvillisuusmuutoksia. Tämän alueen kaakkoispuolella sijaitsevan suolaikun pääsuotyyppeinä ovat lieviksi kuivakoiksi muuttuneet mesotrofiset kalvakka suursara-, ja ruopparimpineva. Inventointialueella olevat ojitusalueet sisältävät pitkälle edenneitä kuivakkoja ja muuttumia, sekä suurelta osin varputurvekangasta. Inventointialueella on myös metsästysmaja/eräkämpä.